IFS-Ruminants-Equines-2024-04-FR
Version 1 - Février 2025
https://doi.org/10.5281/zenodo.14922319

Confinement des chevaux domestiques



Besoins sociaux et de mouvement des chevaux

Les chevaux sont des animaux grégaires qui vivent en groupes avec des liens sociaux forts entre congénères. Ils établissent des relations stables et durables, apprennent les uns des autres et synchronisent leurs activités grâce à la facilitation sociale. Dans des conditions naturelles, les chevaux passent 50 à 75 % de leur journée à marcher pour trouver de la nourriture, de l'eau ou un abri. Lorsqu'ils sont logés dans des boxes individuels, les chevaux sont motivés pour accéder à un parc et le sont encore plus lorsque des congénères sont présents dans ce parc.

Les chevaux sont souvent logés dans des boxes individuels afin d'individualiser leur alimentation et de limiter le risque de blessures causées par des congénères. Dans ces conditions, l'absence de sortie dans des paddocks ou au pâturage, le confinement prolongé et le manque de contact physique avec les congénères peuvent avoir un impact négatif sur leur bien-être.

Exigences légales

La directive 98/58/CE sur la protection des animaux dans les élevages stipule que :

> 'La liberté de mouvement propre à l'animal, compte tenu de son espèce et conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques, ne doit pas être entravée de telle manière que cela lui cause des souffrances ou des dommages inutiles.
> Lorsqu'un animal est continuellement ou habituellement attaché, enchaîné ou maintenu, il doit lui être laissé un espace approprié à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques.' (Directive 98/58/CE, annexe, point 7)

Méthode d'évaluation des conséquences sur le bien-être

La restriction des mouvements ou des contacts sociaux chez les chevaux peut avoir des conséquences négatives sur :

- Leur comportement
- Leur physiologie et leur santé
- Leur cognition
- L'aptitude à l'entraînement et la sécurité (pour les chevaux et les humains)

Ces conséquences peuvent être évaluées et des mesures visant à améliorer le bien-être des chevaux doivent être prises pour leur permettre d'avoir des contacts sociaux appropriés et d'être libres de leurs mouvements.

Pour en savoir plus, voir la revue ***"Confinement, restriction of social contacts and movement in domestic horses"***.

Pour plus de détails, veuillez-vous référer ***à la fiche thématique "Confinement des chevaux domestiques"***.

Recommandations pour l'inspection

Points clés

1. Les chevaux ne devraient pas être enfermés en permanence dans des boxes individuels. Lorsqu'ils sont enfermés, les chevaux doivent avoir un contact visuel et tactile avec leurs congénères et doivent être sortis tous les jours.
2. Le confinement peut être exigé à des moments précis (par exemple lors de compétitions, de traitements vétérinaires, de quarantaine, d'importations).
3. L'hébergement collectif nécessite une gestion adéquate des groupes et de l'espace.

Au cours de l'inspection, il convient de recueillir des informations sur la manière dont les animaux sont hébergés et gérés et d'observer les animaux pour vérifier l'absence de comportement anormal, d'agression entre les animaux ou de blessures pouvant résulter d'agressions.

Collecte d'informations sur les conditions de logement et la gestion des animaux

Collecte d'informations pour les chevaux logés individuellement

Lorsque les chevaux sont logés dans des boxes individuels, il est essentiel que le box soit suffisamment grand pour permettre aux animaux de se mettre en décubitus latéral et de se reposer en sommeil paradoxal. Les dimensions minimales des boxes individuels sont indiquées dans le Tableau 1. En outre, les chevaux gardés dans des boxes individuels doivent avoir un accès régulier à un grand espace pour faire de l'exercice et avoir des contacts avec leurs congénères (figure 1), sauf en cas de conditions météorologiques défavorables (par exemple, alertes météorologiques orange et rouge) ou sur avis vétérinaire.

Tableau 1 : Dimensions minimales recommandées des boxes individuels pour chevaux

Propriétés de la boîte	Formule de calcul des dimensions
Surface (m²)	(2 x hauteur du cheval au garrot)²
Côté le plus court du box (m)	1,5 x hauteur du cheval au garrot
Hauteur du plafond (m)	Hauteur du cheval au garrot +1,2




Figure 1 : Recommandations minimales concernant les interactions sociales et la liberté de mouvement pour les chevaux logés en boxes individuels. Les dimensions des boxes sont données à titre de recommandation minimale pour un cheval mesurant 1,70 m au garrot. L'icône verte représente l'enrichissement de l'environnement.

Collecte d'informations sur les chevaux logés en groupe

Le logement en groupe n'est une réussite que si les ressources sont suffisantes et que le groupe est géré de manière appropriée. Les points à vérifier sont indiqués dans le **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**.

Tableau 2 : Points à prendre en compte lorsque les chevaux sont logés en groupe

Points à aborder lorsque les chevaux sont logés en groupe
La composition du groupe est-elle maintenue de manière à éviter toute perturbation de la hiérarchie sociale ?
Si de nouveaux chevaux sont introduits dans le groupe, cela se fait-il progressivement ?
Les poulains sont-ils élevés avec des juments et d'autres poulains ?
Le sevrage est-il progressif (par exemple, sevrage nutritionnel avant la séparation d'avec la mère, maintien des poulains avec des adultes ou d'autres poulains) afin de minimiser le stress ?
Les jeunes chevaux sont-ils gardés avec les chevaux adultes ?
La zone de couchage est-elle sèche, propre et recouverte de litière ?
Y a-t-il suffisamment d'espace pour que tous les chevaux puissent s'allonger simultanément en décubitus latéral avec les membres étendus ?
L'espace est-il suffisant pour réduire les agressions et les blessures (par exemple, au moins 330 m² par cheval dans un paddock) ?
L'aire d'alimentation est-elle suffisamment grande pour permettre une alimentation simultanée ?
Lorsque les chevaux sont à l'extérieur, y a-t-il une protection contre le soleil, les intempéries, les insectes (par exemple, un abri, un masque anti-mouches) ?
Le logement est-il conçu pour permettre un accès sans entrave aux ressources telles que l'alimentation, l'eau, les blocs de sel, et pour minimiser la concurrence ?
Les interactions sociales sont-elles surveillées pour détecter l'agressivité potentielle et le risque de blessures ?
L'environnement est-il enrichi (enrichissement sensoriel, alimentaire, physique ou occupationnel) ? Voir la ***fiche thématique - Enrichissement de l'environnement pour les équidés***
L'environnement (physique, social, etc.) est-il prévisible et contrôlable pour réduire le stress ?

Observations des animaux

Le confinement peut induire des comportements anormaux, tandis que le logement en groupe permet des interactions sociales (agressives ou affiliatives) entre les animaux. Il convient de vérifier l'absence de comportements anormaux et la présence d'interactions affiliatives plutôt qu'agressives. La synchronisation des activités entre les chevaux est un signe de cohésion du groupe.

1. **Prévalence de comportements anormaux :** stéréotypies (par exemple, tic à l'appui[1] (figure 2), tic de l'ours[2], tic déambulatoire[3]), agressivité, posture de retrait (figure 3)) ou signes connexes liés aux ressources (par exemple, présence de grille anti-tic de l'ours, marques de dents sur la porte du box et sur la mangeoire).

2. **Cohésion du groupe**
    a. Présence d'interactions affiliatives (par exemple, toilettage mutuel ou social[4] , figure 4)
    b. Présence d'interactions agressives (par exemple, menace de morsure ou de coup de pied, morsure, coup de pied, attaque, poursuite, combat)
    c. Présence de blessures et de lésions cutanées résultant d'interactions agressives

[1] Le cheval saisit une surface solide avec ses dents de devant et tire vers l'arrière, contractant les muscles de l'encolure et émettant un grognement caractéristique.
[2] Le cheval bouge la tête et l'encolure d'un côté à l'autre de façon répétée, déplaçant son poids d'un membre à l'autre.
[3] Le cheval fait les cent pas autour des limites d'une zone confinée.
[4] Les chevaux sont en position latérale parallèle inversée, qui permet le grignotage le long du dos ou du garrot de chaque cheval.



Figure 2 : Tic à l'appui



Figure 3 : Position de retrait



Figure 4 : Toilettage mutuel ou social